

FÅNGGRÖDA PÅ VÅREN – VAD ÄR MÖJLIGT ATT SÅ?

| Gräs/ klöverart | VÅRBEHANDLING | | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| | Atlantis OD | Cossack OD | Incelo WG | Hussar Plus OD | Attribut S/ Twin Plus MKH Super | Event Super | Gratil 75 WG |
| Rajgräs | Insådd 7 dagar efter behandling | Insådd 7 dagar efter behandling | Insådd 7 dagar efter behandling | Insådd 7 dagar efter behandling | Insådd 7 dagar efter behandling | OK | OK |
| Rödsvingel | Insådd 7 dagar efter behandling | Insådd 7 dagar efter behandling | Insådd 7 dagar efter behandling | Insådd 7 dagar efter behandling | Insådd 7 dagar efter behandling | OK | OK |
| Ängssvingel | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | OK | OK |
| Timotej | Nej | Nej | Nej | Insådd 7 dagar efter behandling | Nej | Nej, om fånggrödan grott | OK |
| Ängsgröe | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej, om fånggrödan grott | OK |
| Rödklöver | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | OK | Optimal behandlingstidpunkt från klövern spadbladstadie |
| Vitklöver | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | OK | Optimal behandlingstidpunkt från klövern spadbladstadie till 1-2 treväppling |
| Lucern | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | OK | Optimal behandlingstidpunkt från lucernens spadbladstadie till 1-2 treväppling |