

Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från KemI, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten. Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprövningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar. Utvidgat produktgodkännande gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.

Klassificerings- och märkningsinformation gäller även för denna användning.

Användning enligt ovan sker på eget ansvar. Bayer ansvarar inte för eventuell bristande effekt eller skador på grödan.

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>Aliette 80 WG</b>	Vin	<p><b>Mot bladmögel i vinodlingar på friland.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 2,5 kg/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 4 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 10 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 13-79 (från 3 utvecklade blad fram till innan bären börjar mogna och ändra färg)</li> <li>Karenstid: 35 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-1000 l/ha</li> </ol>	Föreningen Svenska Vinodlare
<b>Aliette 80 WG</b>	Jordgubbar i tunnel, allåkerbär och humle på friland	<p><b>Jordgubbar i tunnel – mot svampangrepp</b></p> <p>Maxdos: 4 kg/ha            Max antal behandlingar: 3 per år            Behandlingsintervall: Minst 10 dygn            Behandlingstidpunkt: Efter utplantering            Karenstid: 14 dygn            Vattenmängd: 800-1000 l/ha</p> <p><b>Allåkerbär på friland – mot bladmögel</b></p> <p>Maxdos: 2,1 kg/ha            Max antal behandlingar: 2 per år            Behandlingsintervall: Minst 8 dygn            Behandlingstidpunkt: Före blomning            Karenstid: 14 dygn            Vattenmängd: 400-1000 l/ha</p> <p><b>Nyetableerad humle på friland – mot bladmögel</b></p> <p>Maxdos: 2,5 kg/ha            Max antal behandlingar: 2 per år            Behandlingsintervall: Minst 14 dygn            Behandlingstidpunkt: Maj-augusti            Karenstid: 14 dygn            Vattenmängd: 400-1000 l/ha            Övriga villkor: Behandling av plantan får endast ske upp till 2 meters höjd över marken.</p> <p><b>Etableerad humle på friland – mot bladmögel</b></p> <p>Maxdos: 4 kg/ha (Den totala maximala dosen får uppgå till högst 12 kg produkt per hektar och år)            Max antal behandlingar: 4 per år            Behandlingsintervall: Minst 14 dygn            Behandlingstidpunkt: Maj-augusti            Karenstid: 14 dygn            Vattenmängd: 400-1000 l/ha            Övriga villkor: Behandling av plantan får endast ske upp till 2 meters höjd över marken.</p>	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>Cerone</b>	Tomater	<p><b>Preparatet får användas för synkroniserad mognad av tomater i växthus.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Maxdos: 0,1 ml/m<sup>2</sup> i 100 ml vatten/m<sup>2</sup>.</li> <li>Högst 1 behandling per år.</li> <li>Behandlingstidpunkt: 7-10 dagar före sista skörd.</li> <li>Vid hantering av växtskyddsmedlet eller sprutvåtskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas.</li> <li>Vi sprutning i växthus ska skyddshandskar och skyddskläder användas.</li> </ol>	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
<b>Cerone</b>	Äpple, päron och prydnadsväxter	<p><b>För kartgallring av äpple och päron:</b></p> <p>Maxdos: 0,4 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 7 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 57-72 (ballongstadium till karten är max 20 mm i diameter)  Vattenmängd: 200-500 l/ha  Behandlingsutrustning: Fläktspruta</p> <p><b>För mognadsreglering/färgförbättring av äpplen:</b></p> <p>Maxdos: 0,4 l/ha  Max antal behandlingar: 1 per år  Behandlingstidpunkt: BBCH 78-85  Karenstid: 10 dygn  Vattenmängd: 200-500 l/ha  Behandlingsutrustning: Fläktspruta</p> <p><b>För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus:</b></p> <p>Maxdos: 225 µl/m<sup>2</sup>  Max antal behandlingar: 1 per år (per kalenderår och per kvadratmeter golvyta)  Behandlingstidpunkt: Från BBCH 14 (När växten har minst 4 blad och är 10 cm hög)  Produkten ska spädas med vatten till en koncentration som inte får överstiga 0,15 %.  Behandlingsmetod: Sprutning eller utvattning  För ytterligare villkor se: <a href="http://www.kemi.se">www.kemi.se</a></p>	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag
<b>Event Super</b>	Utsädesodlingar av hundäxing, rörsvingel, ängssvingel och engelskt rajgräs	<p><b>Mot renkavle, flyghavre och åkerven i utsädesodlingar av hundäxing, rörsvingel, ängssvingel och engelskt rajgräs.</b></p> <p><b>Nyetablerade insådda fröodlingar:</b></p> <p>Maxdos: 0,4 l/ha  Max antal behandlingar: 1 per år  Behandlingstidpunkt: BBCH 20-30 Höstbehandling (etableringsåret)  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 150-400 l/ha  Behandlad gröda får inte användas till foder.</p> <p><b>Etableerade fröodlingar av rörsvingel och ängssvingel:</b></p> <p>Maxdos: 0,8 l/ha  Max antal behandlingar: 1 per år  Behandlingstidpunkt: BBCH 30-32 Vårbehandling (fröåret)  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 150-400 l/ha  Behandlad gröda får inte användas till foder.</p> <p><b>Etableerade fröodlingar av engelskt rajgräs:</b></p> <p>Maxdos: 1,0 l/ha  Max antal behandlingar: 1 per år  Behandlingstidpunkt: BBCH 20-30 Vårbehandling (fröåret)  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 150-400 l/ha  Behandlad gröda får inte användas till foder.</p>	Sveriges Frö- och Oljväxtodlare ek. för.

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>Flipper</b>	Stenfrukter, paprika, chili, melon, pumpa, bärbuskar, bladgrönsaker och spåda bladgrönsaker (baby-leaf), kryddväxter, plantskoleväxter och prydnadsväxter i växthus	<b>Stenfrukter, bärbuskar, plantskoleväxter och prydnadsväxter i växthus – mot insektsangrepp</b> Maxdos: 10 l/ha Max antal behandlingar: 5 per odlingssäsong Behandlingsintervall: Minst 7 dygn Karenstid: 1 dag Behandlingsmetod: Sprutning <b>Paprika, chili, melon och pumpa i växthus – mot insektsangrepp</b> Maxdos: 16 l/ha Max antal behandlingar: 5 per odlingssäsong Behandlingsintervall: Minst 7 dygn Karenstid: 1 dag Behandlingsmetod: Sprutning <b>Bladgrönsaker och spåda bladgrönsaker (baby-leaf) och kryddväxter i växthus – mot insektsangrepp</b> Maxdos: 5 l/ha Max antal behandlingar: 5 per odlingssäsong Behandlingsintervall: Minst 7 dygn Karenstid: 1 dag Behandlingsmetod: Sprutning	Alpha BioPesticides Ltd.
<b>Folicur Xpert</b>	Utsädesodlingar av ängsgröe, engelsk rajgräs, vitklöver, rödklöver, alsikeklöver och lusern frö	<b>Ängsgröe och engelskt rajgräs till utsäde – mot svampangrepp</b> Maxdos: 0,5 l/ha Max antal behandlingar: 2 per odlingssäsong Behandlingsintervall: Minst 18 dygn Behandlingstidpunkt: Höst BBCH 14-30 , Vår BBCH 30-69 Vattenmängd: 100-300 l/ha Behandlingsutrustning: Bomspruta Övriga villkor: Högst en behandling på hösten och högst en behandling på våren. Behandlad gröda får inte användas till foder. <b>Röd-, vit- och alsikeklöver samt lucern till utsäde – mot svampangrepp</b> Maxdos: 0,5 l/ha Max antal behandlingar: 2 per kalenderår Behandlingsintervall: Minst 18 dygn Behandlingstidpunkt: BBCH 40-69 Vattenmängd: 100-300 l/ha Behandlingsutrustning: Bomspruta Övriga villkor: Totala maximala dosen per kalenderår får inte överskrida 1,0 liter produkt/ha. Behandlad gröda får inte användas till foder.	Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för.
<b>Gratil 75 WG</b>	Röd-, alsike- och vitklöver	<b>Preparatet får användas för bekämpning av örtartade ogräs (ex. baldersbrå, pilört, målla och viol) i utsädesodlingar av röd-, alsike- och vitklöver.</b> 1. Maxdos: 15 g/ha 2. Högst 1 behandling per år. 3. Behandlingstidpunkt: tidigast när klöveren har nått spadbaldsstadium (BBCH 11)	Frö- och Oljeväxtodlarna ek.för
<b>Gratil 75 WG</b>	Nordmansgran	<b>Preparatet får användas mot örtogräs i odlingar av nordmansgran.</b> Dos: max 20 g produkt/ha Högst 1 behandling/säsong	Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning
<b>Hussar Plus OD reg. nr. 5221</b>	Ängsgröe och rödsvingel	<b>Mot ogräs i utsädesodlingar av ängsgröe och rödsvingel:</b> 1. Dos: 200 ml/ha 2. Antal behandlingar: Max 1 behandling 3. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-30, endast vårbehandling 4. Behandlingsutrustning: Bomspruta Eller: 1. Dos: 100 ml/ha 2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 7-14 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-30, endast vårbehandling 5. Behandlingsutrustning: Bomspruta	Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för.

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
Infinito	Sallat, kål, spenat, kepalök, schalottenlök, vitlök, purjolök, salladslök, kryddväxter, baby leaf och gurka på friland	<p><b>Sallat på friland – mot sallatsbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 1,6 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 10 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 30-49 (från plantan har uppnått 30% av förväntad bladmassa fram till huvudet har uppnått full storlek och typisk form/bladmassan fullbildad)</li> <li>Karenstid: 7 dagar</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha</li> </ol> <p><b>Spenat på friland – mot spenatbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 1,6 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 10 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 19-49 (från plantan har uppnått 9 blad fram till bladmassan är fullbildad)</li> <li>Karenstid: 14 dagar</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha</li> </ol> <p><b>Kål på friland (röd-, vit-, spets- och savojkål, blomkål, broccoli, brysselkål, grönkål och kålrabbi) – mot bladmögel och vitrost</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 1,6 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 3 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 14 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 40-49 (från huvudet börjar bildas fram till huvudet har uppnått full storlek och typisk form/bladmassan fullbildad)</li> <li>Karenstid: 14 dagar</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha</li> </ol> <p><b>Kepalök, schalottenlök och vitlök på friland – mot lökbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 1,6 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 3 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 41-47 (från bladbasen tjocknar och förlängs fram till löken har uppnått full storlek)</li> <li>Karenstid: 7 dagar</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 300-600 l/ha</li> </ol> <p>Lökbladen får inte användas som föda eller foder</p> <p><b>Purjolök och salladslök – mot bladmögel</b></p> <p>Maxdos: 1,6 l/ha</p> <p>Max antal behandlingar: 3 per år</p> <p>Behandlingsintervall: Minst 7 dygn</p> <p>Behandlingstidpunkt: BBCH 41-49</p> <p>Karenstid: 14 dygn</p> <p>Behandlingsutrustning: Bomspruta</p> <p>Vattenmängd: 200-800 l/ha</p> <p><b>Kryddväxter – mot bladmögel</b></p> <p>Maxdos: 1,6 l/ha</p> <p>Max antal behandlingar: 2 per kultur</p> <p>Behandlingsintervall: Minst 10 dygn</p> <p>Behandlingstidpunkt: BBCH 10-49</p> <p>Karenstid: 14 dygn</p> <p>Behandlingsmetod: Sprutningar</p> <p>Vattenmängd: 200-800 l/ha</p> <p><b>Baby-leaf – mot bladmögel</b></p> <p>Maxdos: 1,6 l/ha</p> <p>Max antal behandlingar: 2 per kultur</p> <p>Behandlingsintervall: Minst 10 dygn</p> <p>Behandlingstidpunkt: BBCH 10-18</p> <p>Karenstid: 14 dygn</p> <p>Behandlingsutrustning: Bomspruta</p> <p>Vattenmängd: 200-800 l/ha</p> <p><b>Gurka – mot gurkbladmögel</b></p> <p>Maxdos: 1,6 l/ha</p> <p>Max antal behandlingar: 3 per år</p> <p>Behandlingsintervall: Minst 7 dygn</p> <p>Behandlingstidpunkt: BBCH 21-85</p> <p>Karenstid: 3 dygn</p> <p>Behandlingsutrustning: Bomspruta</p> <p>Vattenmängd: 200-800 l/ha</p> <p>Ytterligare villkor: Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner: Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 L produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.</p>	Bayer A/S och Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>MaisTer</b>	Äpple, päron, plommon och körsbär	<p><b>Mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dos: 150g/ha</li> <li>2. Antal behandlingar: Max 2 behandling</li> <li>3. Behandlingsintervall: Minst 10 dygn</li> <li>4. Behandlingstidpunkt: BBCH &lt;59</li> <li>5. Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>6. Totala maximala dosen får inte överskrida 150 g produkt/ha och odlingssäsong</li> </ol> <p>Etableringsåret kan produkten användas fram till knoppsprickning utan avskärningsutrustning. Skördeår ska produkten användas med en avskärningsutrustning, så att inte sprutvätskan hamnar på trädet, före knoppsprickning</p>	<p>LRF, Lantbrukarnas Riksförbund</p>
<b>Movento SC 100</b>	Jordgubbar, dill, persilja, kepalök, gräslök och stjälkselleri på friland, prydnadsväxter i växthus	<p><b>Jordgubbar på friland - mot insekter och kvalster</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dos: 1,0 l/ha</li> <li>2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>3. Behandlingsintervall: 14 dygn</li> <li>4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-56 eller 91-97 (före blom eller efter skörd)</li> <li>5. Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>6. Rekommenderad vattenmängd: 300-500 l/ha</li> </ol> <p><b>Jordgubbar i tunnel och växthus - mot insekter och kvalster</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dos: 10 ml/100 m<sup>2</sup></li> <li>2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>3. Behandlingsintervall: 14 dygn</li> <li>4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-56 eller 91-93 (före blom eller efter skörd)</li> <li>5. Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>6. Rekommenderad vattenmängd: Tunnel 40-200 ml/m<sup>2</sup>, Växthus 3-5 l/100 m<sup>2</sup></li> </ol> <p><b>Dill o persilja på friland – mot insekter</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dos: 0,45 l/ha</li> <li>2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>3. Behandlingsintervall: 14 dygn</li> <li>4. Behandlingstidpunkt: BBCH 41-49 (från nästintill färdigutvecklad planta fram till skördeklar planta)</li> <li>5. Karenstid: 7 dygn</li> <li>6. Behandlingsmetod: Sprutning</li> </ol> <p><b>Kepalök på friland – mot insekter</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dos: 0,75 l/ha</li> <li>2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>3. Behandlingsintervall: 7 dygn</li> <li>4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-47 (från 3 synliga blad fram till att 70% av lökstorleken är nådd)</li> <li>5. Karenstid: 7 dygn</li> <li>6. Behandlingsmetod: Sprutning</li> </ol> <p><b>Gräslök på friland – mot insekter</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dos: 0,45 l/ha</li> <li>2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>3. Behandlingsintervall: 7 dygn</li> <li>4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-47 (från 3 synliga blad fram till att 70% av lökstorleken är nådd)</li> <li>5. Karenstid: 7 dygn</li> <li>6. Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>7. Får inte användas under blomning</li> </ol> <p><b>Stjälkselleri på friland – mot insekter</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dos: 0,45 l/ha</li> <li>2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>3. Behandlingsintervall: 14 dygn</li> <li>4. Behandlingstidpunkt: BBCH 41-49 (från nästintill färdigutvecklad planta fram till skördeklar planta)</li> <li>5. Karenstid: 7 dygn</li> <li>6. Behandlingsmetod: Sprutning</li> </ol> <p><b>Prydnadsväxter i växthus – mot insekter och kvalster</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dos: 7,5 µl/m<sup>2</sup></li> <li>2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>3. Behandlingsintervall: 14 dygn</li> <li>4. Behandlingstidpunkt: Före blomning</li> <li>5. Behandlingsmetod: Sprutning</li> </ol>	<p>LRF, Lantbrukarnas Riksförbund</p>

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>Movovento SC 100</b>	Morot, rotselleri, rotpersilja, palsternacka, kålrot, rova och rödbeta på friland. Sallatsväxter och bladgrönsaker (även baby-leaf) i tunnel	<p><b>Morot, rotselleri, rotpersilja, palsternacka, kålrot, rova och rödbeta på friland – mot insekter</b>  Maxdos: 0,75 l/ha  Max antal behandlingar: 3 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 12-49  Karenstid: 21 dygn  Vattenmängd: 200-500 l/ha  Behandlingsmetod: Sprutning</p> <p><b>Sallatsväxter och bladgrönsaker (även baby-leaf) i tunnel – mot insekter</b>  Maxdos: 7,5 ml/100 m<sup>2</sup>  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 12-49  Karenstid: 7 dygn  Vattenmängd: 2-5 l/100 m<sup>2</sup>  Behandlingsmetod: Sprutning  För ytterligare villkor se: <a href="http://www.kemi.se">www.kemi.se</a></p>	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag
<b>Movovento SC 100</b>	Vinbär, krusbär, tranbär, blåbär, nypon, havtorn, vinduvor, hallon, blåhallon, björnbär allåkerbär, pak-choi, fänkål, sockermajs och julgranar på friland	<p><b>Vinbär, krusbär, tranbär, blåbär, nypon, havtorn och vinduvor – mot insekter och kvalster</b>  Maxdos: 1,0 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: Behandling kan ske före och efter blomning när grödan är i intensiv tillväxt.  Karenstid: 14 dygn  Behandlingsmetod: Sprutning  Vattenmängd: 300-1000 l/ha</p> <p><b>Hallon, blåhallon, björnbär och allåkerbär – mot insekter och kvalster</b>  Maxdos: 1,0 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: Efter skörd  Behandlingsmetod: Sprutning  Vattenmängd: 300-1000 l/ha</p> <p><b>Pak-choi – mot insekter och kvalster</b>  Maxdos: 0,75 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 12-49  Karenstid: 3 dygn  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 400-500 l/ha</p> <p><b>Fänkål – mot insekter och kvalster</b>  Maxdos: 0,75 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 12-49  Karenstid: 7 dygn  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 400-500 l/ha</p> <p><b>Sockermajs – mot insekter och kvalster</b>  Maxdos: 0,75 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 51-69  Karenstid: 7 dygn  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 300-800 l/ha</p> <p><b>Julgranar – mot insekter och kvalster</b>  Maxdos: 0,75 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: Maj-september  Behandlingsutrustning: Fläktspruta  Vattenmängd: 300-1000 l/ha</p>	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>Previcur Energy</b>	Gurka och spenat på friland, prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland och i växthus	<p><b>Frilandsgurka – mot gurkbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 2,5 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 12-80 (från 2 örtblad fram till innan första frukten är fullt mogen)</li> <li>Karenstid: 3 dagar</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 600 l/ha</li> </ol> <p><b>Spenat – mot spenatbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 2,5 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 7-10 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 14-48 (från 4 örtblad fram till 80 % av förväntad bladmassa uppnåtts)</li> <li>Karenstid: 14 dagar</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 250-1000 l/ha</li> </ol> <p><b>Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland, Max planthöjd 50 cm – mot bladmögelssvampar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 2,5 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 5-10 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-600 l/ha</li> </ol> <p>Om produkten används på frukt bärande träd, buskar eller plantor ska frukt/bär avlägsnas före försäljning.</p> <p><b>Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland – mot förökningssvampar (<i>Pythium spp.</i>, <i>Phytophthora spp.</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 3 l/ha (0,30 ml/m<sup>2</sup>)</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 10-14 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Utvattning på fuktigt substrat</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-2000 l/ha. Eftervattna med 25-30 mm vatten så att preparatet når rötterna.</li> </ol> <p>Vid container-odling beräkna 2-4 liter vatten/ m<sup>2</sup>. Eftervattna med rent vatten.</p> <p><b>Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter i växthus – mot bladmögelssvampar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,25 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar per kultur</li> <li>Behandlingsintervall: 5-10 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 20-60 ml vatten/m<sup>2</sup></li> </ol> <p>Om produkten används på frukt bärande träd, buskar eller plantor ska frukt/bär avlägsnas före försäljning.</p> <p><b>Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter i växthus – mot förökningssvampar (<i>Pythium spp.</i>, <i>Phytophthora spp.</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 3 ml/m<sup>2</sup> (30 l/ha)</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 10-14 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Utvattning på fuktigt substrat</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 2-4 liter vatten/m<sup>2</sup>. Eftervattna med rent vatten.</li> </ol> <p>Av hälsoskäl (för sprutförare) ska behandlad växthusyta vara mindre än 9500 m<sup>2</sup> per dag.</p>	<p>LRF, Lantbrukarnas Riksförbund</p>
<b>Sencor SC 600</b>	Morötter och sparris på friland	<p><b>Mot ogräs vid odling av morötter och sparris på friland:</b></p> <p><b>Morötter alternativ 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,1 l/ha + 0,075 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: Minst 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 00 (före uppkomst) eller BBCH 12-16 (när morötterna har 2-6 flikiga blad)</li> <li>Karenstid: 60 dygn</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> </ol> <p><b>Morötter alternativ 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,075 l/ha + 0,075 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: Minst 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 12-16 (när morötterna har 2-6 flikiga blad)</li> <li>Karenstid: 60 dygn</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> </ol> <p><b>Sparris:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,3 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 1 behandling</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 14-19</li> <li>Karenstid: 7 dygn</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> </ol>	<p>LRF, Lantbrukarnas Riksförbund</p>

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>Sencor SC 600</b>	Plantskoleväxter	<b>Mot ogräs i frilandsodling av plantskoleväxter före vegetering:</b> Maxdos: 0,35 l/ha Max antal behandlingar: 1 per år Behandlingstidpunkt: April - juli Vattenmängd: 200-400 l/ha Behandlingsutrustning: Bomspruta Behandling får inte göras då ogrästäcket är högre än 10 cm.	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag
<b>Serenade ASO</b>	Jordgubbar och lök på friland, växthusodling av sallat, björnbär, hallon, vinbär, gurkväxter med ätliga skal, plantskolor och skogsplantskolor	<b>Jordgubbar på friland – mot svampangrepp:</b> Maxdos: 8 l/ha Max antal behandlingar: 6 per år Behandlingstidpunkt: Från 3-bladstadium till vintervila Behandlingsintervall: Minst 5 dygn Behandlingsmetod: Sprutning <b>Sallat i växthus – mot svampangrepp</b> Maxdos: 8 l/ha Max antal behandlingar: 6 per kultur Behandlingstidpunkt: BBCH 13-49 Behandlingsintervall: Minst 5 dygn Behandlingsmetod: Sprutning <b>Björnbär, hallon och vinbär – mot svampangrepp</b> Maxdos: 8 l/ha Max antal behandlingar: 6 per år Behandlingstidpunkt: BBCH 51-85 Behandlingsintervall: Minst 5 dygn Behandlingsmetod: Sprutning <b>Gurkväxter med ätliga skal – mot svampangrepp</b> Maxdos: 8 l/ha Max antal behandlingar: 6 per kultur Behandlingstidpunkt: BBCH 12-89 Behandlingsintervall: Minst 5 dygn Behandlingsmetod: Sprutning <b>Lök på friland – mot svampangrepp</b> Maxdos: 8 l/ha Max antal behandlingar: 6 per år Behandlingstidpunkt: BBCH 16-47 Behandlingsintervall: Minst 7 dygn Behandlingsmetod: Sprutning <b>Plantskolor och skogsplantskolor – mot svampangrepp</b> Maxdos: 8 l/ha Max antal behandlingar: 6 per år Behandlingstidpunkt: BBCH 12-89 Behandlingsintervall: Minst 5 dygn Behandlingsmetod: Sprutning	Bayer A/S
<b>Teldor WG 50</b>	Vin	<b>Preparatet får användas för bekämpning av gråmögel i vinodlingar på friland.</b> Dos: 0,1%-ig lösning, högst 1500 l/ha. 1 behandling vid begynnande mognad. Karenstid: 21 dagar.	Föreningen Svenska Vinodlare
<b>Teldor WG 50</b>	Skogsplantskolor	<b>Preparatet får användas för bekämpning av gråmögel i skogsplantskolor.</b> Högsta tillåtna dos är 750 g aktiv substans per ha (1,5 kg medel per ha). Medlet får appliceras högst tre gånger per säsong.	Föreningen Sveriges Skogsplantproducenter
<b>Teldor WG 50</b>	Äpple och päron	<b>Äpple och päron – mot bägarröta (Botrytis) och fruktmögel (Monilia)</b> 1. Dos: 1,5 kg/ha 2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 10 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 60-69 (under blom) 5. Behandlingsutrustning: Fläktspruta	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
<b>Tramat SC 500</b>	Rödbetor	<b>Mot ogräs i odlingar av rödbetor på friland:</b> Dosering: 1 x 0,45 l/ha eller 2 x 0,25 l/ha eller 3 x 0,14 l/ha Max antal behandlingar: 3 per år Behandlingsintervall: Minst 7 dygn Behandlingstidpunkt: BBCH 10-18 Vattenmängd: 150-200 l/ha Behandlingsutrustning: Bomspruta Får ej användas i odlingar av baby-leaf.	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag