

Previcur Energy

Fungicid – Växtskyddsmedel – Klass 2 L – Reg Nr 5046

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Mot svampangrepp i odlingar av sallat på friland och i växthus.

Mot svampangrepp i odlingar av tomat och gurka i växthus.

Mot svampangrepp i odlingar av småplantor av huvudkål, blomkål, broccoli och brysselkål i växthus.

All annan användning är otillåten om det inte särskilt tillåts.

UPMA

Utvidgat produktgodkännande finns för nedanstående grödor. Se vår hemsida för kompletta villkor.

Grödor: Gurka och spenat på friland, prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland och i växthus.

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Gröda	Tillåten behandling					Karensid (dygn)
	Skadegörare	Tidpunkt, utvecklingsstadium	Maxdos	Max antal behandl.	Vätskemängd	
Sallat i växthus* ¹	Pythium spp.	DC 01-10* ²	Utvattning: 3 ml/m ²	2	2-4 l/m ²	21
Sallat på friland och i växthus* ¹	Sallatsbladmögel	DC 12-41* ³	Sprutning: 2,5 l/ha	2	250-1000 l/ha	21
Huvudkål, blomkål, broccoli och brysselkål (Behandling av småplantor i växthus* ¹ innan utplantering i fält)	Pythium spp.	DC 01-13* ²	Utvattning: 3 ml/m ²	2	2-4 l/m ²	-
Tomat och gurka i växthus* ¹	Pythium spp.	DC 01-10* ²	Utvattning: 3 ml/m ²	2	2-4 l/m ²	3
		DC 12-80* ³	Droppbevattning: 0,3 ml/m ³	4		3

*¹ Utformning av växthus se "UTFORMNING AV VÄXTHUS" PÅ SIDE 100¹⁰⁶
*² Behandlingen ska göras innan utplantering
*³ Behandlingen ska göras efter utplanteringen

VERKSAM BESTÄNDSDEL

Propamocarb (hydroklorid) 530 g/l.

Fosetyl 310 g/l.

FORMULERING

SL, Vattenlösligt koncentrat

VERKNINGSSÄTT

Previcur Energy innehåller två aktiva substanser från olika kemiska grupper: propamocarb som tillhör den kemiska gruppen karbamater och fosetyl tillhör den kemiska gruppen fosfonater.

Previcur Energy är ett systemiskt svampmedel och kombinationen av propamocarb + fosetyl, skyddar effektivt rötter och ovanjordiska plantdelar mot äggsporsvampar (Oomyceter).

Kombinationen har "multi-site" verkningsätt och är därför lämplig som del av en strategi för att undgå resistens. Medlet har direkt effekt genom att motverka mycelltillväxt/inträngning samt sporproduktion och sporgroning. Indirekt har medlet effekt genom att stimulera plantans naturliga försvarmekanismer och främja tillväxten.

ANVÄNDNING

Previcur Energy används för bekämpning av sallatsbladmögel (*Bremia lactucae*) på sallat i växthus och på friland, mot förökningssjukdomar eller "damping-off" förorsakat av *Pythium* spp. på småplantor av sallat, kål (huvudkål, blomkål, broccoli och brysselkål), tomat och gurka i växthus under plantuppdragningen, samt till förebyggande behandling av tomat och gurka mot *Pythium* spp. genom tillförsel via droppbevattning.

Sidoeffekt kan uppnås på en rad andra Oomyceter, till exempel *Phytophthora*-arter. För att säkra god kontroll av sjukdomar förorsakade av Oomyceter skall Previcur Energy användas förebyggande.

Previcur Energy

REKOMMENDATION

Gröda	Skadegörare	Behandlingstidspunkt	Dosering	Observera
Sallat	<i>Pythium spp.</i>	Behandling av småplantor i växthus innan utplantering. Utvattning: 1:a behandlingen direkt efter sådd. 2:a behandlingen efter uppkomst, 10-14 dagar senare.	3 ml/m ²	Utvattning på fuktigt medium i 2-4 l vatten/m ² Max 2 behandlingar per gröda.
	<i>Sallatsbladmögel</i>	Förebyggande behandling genom sprutning efter utplantering. Efterföljande behandling ca. 10 dagar senare.	2,5 l/ha	Sprutas ut i 250-1000 l vatten/ha Max 2 behandlingar per gröda.
Huvudkål, blomkål, broccoli och brysselkål	<i>Pythium spp.</i>	Behandling av småplantor i växthus innan utplantering i fält. Utvattning: 1:a behandlingen direkt efter sådd. 2:a behandlingen efter uppkomst, 10-14 dagar senare.	3 ml/m ²	Utvattning på fuktigt medium i 2-4 l vatten/m ² Max 2 behandlingar per gröda.
Tomat och gurka	<i>Pythium spp.</i>	Behandling av småplantor innan utplantering. Utvattning: 1:a behandlingen direkt efter sådd. 2:a behandlingen efter uppkomst, 10-14 dagar senare.	3 ml/m ²	Utvattning på fuktigt medium i 2-4 l vatten/m ² Max 2 behandlingar per gröda.
		Efter utplantering tillfört via droppbevattning: 1:a behandlingen direkt efter utplantering. Efterföljande behandlingar med 10-14 dagars intervall.	(0,1-) 0,3 ml/m ²	Gurkor kan vara känsliga för behandling de 10 första dagarna efter utplantering, därför ska endast 0,1 ml/m ² användas. Max 4 behandlingar per gröda.

BLANDBARHET

Previcur Energy bör ej blandas med andra produkter.

RESISTENS

Previcur Energy innehåller två aktiva substanser från två olika kemiska grupper. Propamocarb tillhör den kemiska gruppen karbamater (FRAC-kod 28). Fosetyl tillhör den kemiska gruppen fosfonater (FRAC-kod 33).

ÖVRIGT

Lagring Förvaras mörkt, svalt och frostfritt i sluten märkt originalförpackning, oåtkomligt för barn och husdjur samt åtskilt från födoämnen.

Transportförpackning 12 förpackningar à 1 l.