

# UPMA

(UTVIDGAT PRODUKTGODKÄNNANDE FÖR MINDRE ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN, TIDIGARE KALLAT "OFF-LABEL")

Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från KemI, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten. Vid UPMA görs inga effektivitetstester eller fytotoxicitetsprovningar, användning av produkten sker på användarens eget ansvar. Utvidgat produktgodkännande gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.

Klassificerings- och märkningsinformation gäller även för denna användning.

Användning enligt ovan sker på eget ansvar. Bayer ansvarar inte för eventuell bristande effekt eller skador på grödan.

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
Aliette 80 WG	Vin	<b>Mot bladmögel i vinodlingar på friland</b> 1. Dos: 2,5 kg/ha 2. Antal behandlingar: Max 4 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 10 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-79 (från 3 utvecklade blad fram till innan bären börjar mogna och ändra färg) 5. Karenstid: 35 dygn 6. Behandlingsmetod: Sprutning 7. Rekommenderad vattenmängd: 200-1000 l/ha	Föreningen Svenska Vinodlare
Aliette 80 WG	Jordgubbar i tunnel, allåkerbär och humle på friland	<b>Jordgubbar i tunnel – mot svampangrepp</b> Maxdos: 4 kg/ha Max antal behandlingar: 3 per år Behandlingsintervall: Minst 10 dygn Behandlingstidpunkt: Efter utplantering Karenstid: 14 dygn Vattenmängd: 800-1000 l/ha <b>Allåkerbär på friland – mot bladmögel</b> Maxdos: 2,1 kg/ha Max antal behandlingar: 2 per år Behandlingsintervall: Minst 8 dygn Behandlingstidpunkt: Före blomning Karenstid: 14 dygn Vattenmängd: 400-1000 l/ha <b>Nyetablerad humle på friland – mot bladmögel</b> Maxdos: 2,5 kg/ha Max antal behandlingar: 2 per år Behandlingsintervall: Minst 14 dygn Behandlingstidpunkt: Maj-augusti Karenstid: 14 dygn Vattenmängd: 400-1000 l/ha Övriga villkor: Behandling av plantan får endast ske upp till 2 meters höjd över marken. <b>Etablerad humle på friland – mot bladmögel</b> Maxdos: 4 kg/ha (Den totala maximala dosen får uppgå till högst 12 kg produkt per hektar och år) Max antal behandlingar: 4 per år Behandlingsintervall: Minst 14 dygn Behandlingstidpunkt: Maj-augusti Karenstid: 14 dygn Vattenmängd: 400-1000 l/ha Övriga villkor: Behandling av plantan får endast ske upp till 2 meters höjd över marken.	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag



Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
Betanal	Jordgubbar på friland och i tunnel, rödbetor på friland och utsädesodlingar av spenat och krysantemum	<p><b>Mot örtogräs i odlingar av jordgubbar på friland och i tunnel</b>  Maxdos: 2 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 6 dagar  Behandlingstidpunkt: BBCH 10-18 och/eller efter avslutad skörd  Karenstid: 35 dagar  Behandlingsutrustning: Bandspruta</p> <p><b>Mot örtogräs i odlingar av rödbetor</b>  Maxdos: 2 l/ha  Max antal behandlingar: 3 per år  Behandlingsintervall: Minst 6 dagar  Behandlingstidpunkt: BBCH 10-18  Karenstid: 60 dagar  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Blasten får inte användas till livsmedel eller foder</p> <p><b>Mot örtogräs i utsädesproduktion av spenat och krysantemum</b>  Maxdos: 1,5 l/ha  Max antal behandlingar: 3 per år  Behandlingsintervall: Minst 6 dagar  Behandlingstidpunkt: BBCH 10-18  Behandlingsutrustning: Bomspruta</p>	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag
Cerone	Tomater	<p><b>Preparatet får användas för synkroniserad mognad av tomater i växthus</b>  1. Maxdos: 0,1 ml/m<sup>2</sup> i 100 ml vatten/m<sup>2</sup>.  2. Högst 1 behandling per år.  3. Behandlingstidpunkt: 7-10 dagar före sista skörd.  4. Vid hantering av växtskyddsmedlet eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas.  5. Vi sprutning i växthus ska skyddshandskar och skyddskläder användas.</p>	
Cerone	Äpple, päron och prydnadsväxter	<p><b>För kartgallring av äpple och päron:</b>  Maxdos: 0,4 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 7 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 57-72 (ballongstadium till karten är max 20 mm i diameter)  Vattenmängd: 200-500 l/ha  Behandlingsutrustning: Fläktspruta</p> <p><b>För mognadsreglering/färgförbättring av äpplen:</b>  Maxdos: 0,4 l/ha  Max antal behandlingar: 1 per år  Behandlingstidpunkt: BBCH 78-85  Karenstid: 10 dygn  Vattenmängd: 200-500 l/ha  Behandlingsutrustning: Fläktspruta</p> <p><b>För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus:</b>  Maxdos: 225 µl/m<sup>2</sup>  Max antal behandlingar: 1 per år (per kalenderår och per kvadratmeter golvyta)  Behandlingstidpunkt: Från BBCH 14 (När växten har minst 4 blad och är 10 cm hög)  Produkten ska spädas med vatten till en koncentration som inte får överstiga 0,15 %.  Behandlingsmetod: Sprutning eller utvattning  För ytterligare villkor se: <a href="http://www.kemi.se">www.kemi.se</a></p>	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag
Event Super	Utsädesodlingar av hundåxing, rörsvingel, ängssvingel och engelskt rajgräs	<p><b>Mot renkavle, flyghavre och åkerven i utsädesodlingar av hundåxing, rörsvingel, ängssvingel och engelskt rajgräs</b></p> <p><b>Nyetablerade insådda fröodlingar:</b>  Maxdos: 0,4 l/ha  Max antal behandlingar: 1 per år  Behandlingstidpunkt: BBCH 20-30 Höstbehandling (etableringsåret)  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 150-400 l/ha  Behandlad gröda får inte användas till foder.</p> <p><b>Etablerade fröodlingar av rörsvingel och ängssvingel:</b>  Maxdos: 0,8 l/ha  Max antal behandlingar: 1 per år  Behandlingstidpunkt: BBCH 30-32 Vårbehandling (fröåret)  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 150-400 l/ha  Behandlad gröda får inte användas till foder.</p> <p><b>Etablerade fröodlingar av engelskt rajgräs:</b>  Maxdos: 1,0 l/ha  Max antal behandlingar: 1 per år  Behandlingstidpunkt: BBCH 20-30 Vårbehandling (fröåret)  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 150-400 l/ha  Behandlad gröda får inte användas till foder.</p>	Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för.

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
Flipper	Stenfrukter, paprika, chilli, melon, pumpa, bärbuskar, bladgrönsaker och späda bladgrönsaker (baby-leaf), kryddväxter, plantskoleväxter och prydnadsväxter i växthus	<p><b>Stenfrukter, bärbuskar, plantskoleväxter och prydnadsväxter i växthus – mot insektsangrepp</b>  Maxdos: 10 l/ha  Max antal behandlingar: 5 per odlings säsong  Behandlingsintervall: Minst 7 dygn  Karenstid: 1 dag  Behandlingsmetod: Sprutning</p> <p><b>Paprika, chili, melon och pumpa i växthus – mot insektsangrepp</b>  Maxdos: 16 l/ha  Max antal behandlingar: 5 per odlings säsong  Behandlingsintervall: Minst 7 dygn  Karenstid: 1 dag  Behandlingsmetod: Sprutning</p> <p><b>Bladgrönsaker och späda bladgrönsaker (baby-leaf) och kryddväxter i växthus – mot insektsangrepp</b>  Maxdos: 5 l/ha  Max antal behandlingar: 5 per odlings säsong  Behandlingsintervall: Minst 7 dygn  Karenstid: 1 dag  Behandlingsmetod: Sprutning</p>	Alpha BioPesticides Ltd.
Folicur Xpert	Utsådesodlingar av ängsgröe, engelsk rajgräs, vitklöver, rödklöver, alsikeklöver och lusern frö	<p><b>Ängsgröe och engelskt rajgräs till utsäde – mot svampangrepp</b>  Maxdos: 0,5 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per odlings säsong  Behandlingsintervall: Minst 18 dygn  Behandlingstidpunkt: Höst BBCH 14-30 , Vår BBCH 30-69  Vattenmängd: 100-300 l/ha  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Övriga villkor: Högst en behandling på hösten och högst en behandling på våren.  Behandlad gröda får inte användas till foder.</p> <p><b>Röd-, vit- och alsikeklöver samt lucern till utsäde – mot svampangrepp</b>  Maxdos: 0,5 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per kalenderår  Behandlingsintervall: Minst 18 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 40-69  Vattenmängd: 100-300 l/ha  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Övriga villkor: Totala maximala dosen per kalenderår får inte överskrida 1,0 liter produkt/ha. Behandlad gröda får inte användas till foder.</p>	Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för.
Gratil 75 WG	Röd-, alsike- och vitklöver	<p><b>Preparatet får användas för bekämpning av örtartade ogräs (ex. baldersbrå, pilört, målla och viol) i utsådesodlingar av röd-, alsike- och vitklöver</b>  1. Maxdos: 15 g/ha  2. Högst 1 behandling per år.  3. Behandlingstidpunkt: tidigast när klöveren har nått spadbaldsstadium (BBCH 11)</p>	Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för.
Gratil 75 WG	Nordmansgran	<p><b>Preparatet får användas mot örtogräs i odlingar av nordmansgran</b>  Dos: max 20 g produkt/ha  Högst 1 behandling/säsong</p>	Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
Infinito	Sallat, kål, spenat, kepalök, schalottenlök, vitlök, purjolök, salladslök, kryddväxter, baby leaf och gurka på friland	<p><b>Sallat på friland – mot sallatsbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 1,6 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 10 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 30-49 (från plantan har uppnått 30% av förväntad bladmassa fram till huvudet har uppnått full storlek och typisk form/bladmassan fullbildad)</li> <li>Karenstid: 7 dagar</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha</li> </ol> <p><b>Spenat på friland – mot spenatbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 1,6 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 10 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 19-49 (från plantan har uppnått 9 blad fram till bladmassan är fullbildad)</li> <li>Karenstid: 14 dagar</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha</li> </ol> <p><b>Kål på friland (röd-, vit-, spets- och savojkål, blomkål, broccoli, brysselkål, grönkål och kålrabbi) – mot bladmögel och vitrost</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 1,6 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 3 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 14 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 40-49 (från huvudet börjar bildas fram till huvudet har uppnått full storlek och typisk form/bladmassan fullbildad)</li> <li>Karenstid: 14 dagar</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha</li> </ol> <p><b>Kepalök, schalottenlök och vitlök på friland – mot lökbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 1,6 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 3 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 41-47 (från bladbasen tjocknar och förlängs fram till löken har uppnått full storlek)</li> <li>Karenstid: 7 dagar</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 300-600 l/ha</li> </ol> <p>Lökbladen får inte användas som föda eller foder.</p> <p><b>Purjolök och salladslök – mot bladmögel</b></p> <p>Maxdos: 1,6 l/ha  Max antal behandlingar: 3 per år  Behandlingsintervall: Minst 7 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 41-49  Karenstid: 14 dygn  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 200-800 l/ha</p> <p><b>Kryddväxter – mot bladmögel</b></p> <p>Maxdos: 1,6 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per kultur  Behandlingsintervall: Minst 10 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 10-49  Karenstid: 14 dygn  Behandlingsmetod: Sprutningar  Vattenmängd: 200-800 l/ha</p> <p><b>Baby-leaf – mot bladmögel</b></p> <p>Maxdos: 1,6 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per kultur  Behandlingsintervall: Minst 10 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 10-18  Karenstid: 14 dygn  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 200-800 l/ha</p> <p><b>Gurka – mot gurkbladmögel</b></p> <p>Maxdos: 1,6 l/ha  Max antal behandlingar: 3 per år  Behandlingsintervall: Minst 7 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 21-85  Karenstid: 3 dygn  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 200-800 l/ha</p> <p>Ytterligare villkor: Eftersom fluopikolid riskerar att läcka till grundvattnet behövs följande restriktioner: Totala maximala dosen får inte överskrida 4,8 L produkt/ha och år, dessutom får behandlingen endast utföras vart tredje år på samma fält.</p>	Bayer A/S och Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>MaisTer</b>	Äpple, päron, plommon och körsbär	<b>Mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär</b> 1. Dos: 150g/ha 2. Antal behandlingar: Max 2 behandling 3. Behandlingsintervall: Minst 10 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH <59 5. Behandlingsutrustning: Bomspruta 6. Totala maximala dosen får inte överskrida 150 g produkt/ha och odlingssäsong Etableringsåret kan produkten användas fram till knoppsprickning utan avskärningsutrustning. Skördeår ska produkten användas med en avskärningsutrustning, så att inte sprutvätskan hamnar på trädet, före knoppsprickning.	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
<b>Mateno Duo</b>	Utsädesodlingar av rödsvingel, fårsvingel, hårdsvingel och ängsgröe	<b>Mot gräsogräs i utsädesodlingar av rödsvingel, fårsvingel, hårdsvingel och ängsgröe</b> Maxdos: 0,35 l/ha Max antal behandlingar: 1 per år Behandlingstidpunkt: Efter uppkomst. Endast höstbehandling. Behandlingsutrustning: Bomspruta Ytterligare villkor: Behandlad gröda får ej användas till foder	Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för.
<b>Movento SC 100</b>	Jordgubbar, dill, persilja, kepalök, gräslök och stjälskelleri på friland, prydnadsväxter i växthus	<b>Jordgubbar på friland – mot insekter och kvalster</b> 1. Dos: 1,0 l/ha 2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 14 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-56 eller 91-97 (före blom eller efter skörd) 5. Behandlingsmetod: Sprutning 6. Rekommenderad vattenmängd: 300-500 l/ha <b>Jordgubbar i tunnel och växthus – mot insekter och kvalster</b> 1. Dos: 10 ml/100 m <sup>2</sup> 2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 14 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-56 eller 91-93 (före blom eller efter skörd) 5. Behandlingsmetod: Sprutning 6. Rekommenderad vattenmängd: Tunnel 40-200 ml/m <sup>2</sup> , Växthus 3-5 l/100 m <sup>2</sup> <b>Dill och persilja på friland – mot insekter</b> 1. Dos: 0,45 l/ha 2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 14 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 41-49 (från nästintill färdigutvecklad planta fram till skördeklar planta) 5. Karenstid: 7 dygn 6. Behandlingsmetod: Sprutning <b>Kepalök på friland – mot insekter</b> 1. Dos: 0,75 l/ha 2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 7 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-47 (från 3 synliga blad fram till att 70% av lökstorleken är nådd) 5. Karenstid: 7 dygn 6. Behandlingsmetod: Sprutning <b>Gräslök på friland – mot insekter</b> 1. Dos: 0,45 l/ha 2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 7 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-47 (från 3 synliga blad fram till att 70% av lökstorleken är nådd) 5. Karenstid: 7 dygn 6. Behandlingsmetod: Sprutning 7. Får inte användas under blomning <b>Stjälskelleri på friland – mot insekter</b> 1. Dos: 0,45 l/ha 2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 14 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 41-49 (från nästintill färdigutvecklad planta fram till skördeklar planta) 5. Karenstid: 7 dygn 6. Behandlingsmetod: Sprutning <b>Prydnadsväxter i växthus – mot insekter och kvalster</b> 1. Dos: 7,5 µl/m <sup>2</sup> 2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 14 dygn 4. Behandlingstidpunkt: Före blomning 5. Behandlingsmetod: Sprutning	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
Movento SC 100	Morot, rotselleri, rotpersilja, palsternacka, kålrot, rova och rödbeta på friland. Sallatsväxter och bladgrönsaker (även baby-leaf) i tunnel	<p><b>Morot, rotselleri, rotpersilja, palsternacka, kålrot, rova och rödbeta på friland – mot insekter</b>  Maxdos: 0,75 l/ha  Max antal behandlingar: 3 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 12-49  Karenstid: 21 dygn  Vattenmängd: 200-500 l/ha  Behandlingsmetod: Sprutning</p> <p><b>Sallatsväxter och bladgrönsaker (även baby-leaf) i tunnel – mot insekter</b>  Maxdos: 7,5 ml/100 m<sup>2</sup>  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 12-49  Karenstid: 7 dygn  Vattenmängd: 2-5 l/100 m<sup>2</sup>  Behandlingsmetod: Sprutning  För ytterligare villkor se: <a href="http://www.kemi.se">www.kemi.se</a></p>	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag
Movento SC 100	Vinbär, krusbär, tranbär, blåbär, nypon, havtorn, vinduvor, hallon, blåhallon, björnbär allåkerbär, pak choi, fänkål, sockermajs och julgranar på friland	<p><b>Vinbär, krusbär, tranbär, blåbär, nypon, havtorn och vindruvor – mot insekter och kvalster</b>  Maxdos: 1,0 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: Behandling kan ske före och efter blomning när grödan är i intensiv tillväxt.  Karenstid: 14 dygn  Behandlingsmetod: Sprutning  Vattenmängd: 300-1000 l/ha</p> <p><b>Hallon, blåhallon, björnbär och allåkerbär – mot insekter och kvalster</b>  Maxdos: 1,0 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: Efter skörd  Behandlingsmetod: Sprutning  Vattenmängd: 300-1000 l/ha</p> <p><b>Pak choi – mot insekter och kvalster</b>  Maxdos: 0,75 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 12-49  Karenstid: 3 dygn  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 400-500 l/ha</p> <p><b>Fänkål – mot insekter och kvalster</b>  Maxdos: 0,75 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 12-49  Karenstid: 7 dygn  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 400-500 l/ha</p> <p><b>Sockermajs – mot insekter och kvalster</b>  Maxdos: 0,75 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 51-69  Karenstid: 7 dygn  Behandlingsutrustning: Bomspruta  Vattenmängd: 300-800 l/ha</p> <p><b>Julgranar – mot insekter och kvalster</b>  Maxdos: 0,75 l/ha  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: Maj-september  Behandlingsutrustning: Fläktspruta  Vattenmängd: 300-1000 l/ha</p>	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
Previcur Energy	Gurka och spenat på friland, prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland och i växthus	<p><b>Frilandsgurka – mot gurbldmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 2,5 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 12-80 (från 2 örtblad fram till innan första frukten är fullt mogen)</li> <li>Karenstid: 3 dagar</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 600 l/ha</li> </ol> <p><b>Spenat – mot spenatbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 2,5 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 7-10 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 14-48 (från 4 örtblad fram till 80 % av förväntad bladmassa uppnått)</li> <li>Karenstid: 14 dagar</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 250-1000 l/ha</li> </ol> <p><b>Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland, Max planthöjd 50 cm – mot bladmögelsvampar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 2,5 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 5-10 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-600 l/ha</li> </ol> <p>Om produkten används på frukt bärande träd, buskar eller plantor ska frukt/bär avlägsnas före försäljning.</p> <p><b>Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland – mot förökningssvampar (Pythium spp., Phytophthora spp.)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 3 l/ha (0,30 ml/m<sup>2</sup>)</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 10-14 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Utvattning på fuktigt substrat</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-2000 l/ha. Eftervattna med 25-30 mm vatten så att preparatet når rötterna.</li> </ol> <p>Vid container-odling beräkna 2-4 liter vatten/ m<sup>2</sup>. Eftervattna med rent vatten.</p> <p><b>Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter i växthus – mot bladmögelsvampar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,25 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar per kultur</li> <li>Behandlingsintervall: 5-10 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 20-60 ml vatten/m<sup>2</sup></li> </ol> <p>Om produkten används på frukt bärande träd, buskar eller plantor ska frukt/bär avlägsnas före försäljning.</p> <p><b>Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter i växthus – mot förökningssvampar (Pythium spp., Phytophthora spp.)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 3 ml/m<sup>2</sup> (30 l/ha)</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 10-14 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Utvattning på fuktigt substrat</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 2-4 liter vatten/m<sup>2</sup>. Eftervattna med rent vatten.</li> </ol> <p>Av hälsoskäl (för sprutförare) ska behandlad växthusyta vara mindre än 9500 m<sup>2</sup> per dag.</p>	<p>LRF, Lantbrukarnas Riksförbund</p>
Propulse SE 250	Kepalök och schalottenlök	<p><b>Mot svampangrepp, särskilt gråmögelbladfläcksjuka och Stemphylium i kepalök och schalottenlök</b></p> <p>Dosering: Behandling kan ske med antingen en behandling med max 0,8 l/ha eller med två behandlingar med max 0,5 l/ha. Den totala maximala dosen får inte överstiga 1 l/ha.</p> <p>Max antal behandlingar: 2 per år</p> <p>Behandlingstidpunkt: BBCH 41 (bladbasen tjocknar och förlängs) till och med BBCH 47 (70 % av lökstorleken uppnådd, 10 % av bladen har böjt sig).</p> <p>Behandlingsintervall: Minst 7 dagar</p> <p>Karenstid: 7 dagar</p> <p>Vattenmängd: 100-400 l/ha</p> <p>Behandlingsutrustning: Bomspruta</p>	<p>Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag</p>

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
Sencor SC 600	Morötter och sparris på friland	<p><b>Mot ogräs vid odling av morötter och sparris på friland</b></p> <p><b>Morötter alternativ 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,1 l/ha + 0,075 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: Minst 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 00 (före uppkomst) eller BBCH 12-16 (när morötterna har 2-6 flikiga blad)</li> <li>Karenstid: 60 dygn</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> </ol> <p><b>Morötter alternativ 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,075 l/ha + 0,075 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: Minst 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 12-16 (när morötterna har 2-6 flikiga blad)</li> <li>Karenstid: 60 dygn</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> </ol> <p><b>Sparris:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,3 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 1 behandling</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 14-19</li> <li>Karenstid: 7 dygn</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> </ol>	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
Sencor SC 600	Plantskoleväxter	<p><b>Mot ogräs i frilandsodling av plantskoleväxter före vegetering</b></p> <p>Maxdos: 0,35 l/ha</p> <p>Max antal behandlingar: 1 per år</p> <p>Behandlingstidpunkt: April - juli</p> <p>Vattenmängd: 200-400 l/ha</p> <p>Behandlingsutrustning: Bomspruta</p> <p>Behandling får inte göras då ogrästäcket är högre än 10 cm.</p>	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag
Serenade ASO	Jordgubbar och lök på friland, växthusodling av sallat, björnbär, hallon, vinbär, gurkväxter med ätliga skal, plantskolor och skogsplantskolor	<p><b>Jordgubbar på friland – mot svampangrepp</b></p> <p>Maxdos: 8 l/ha</p> <p>Max antal behandlingar: 6 per år</p> <p>Behandlingstidpunkt: Från 3-bladstadium till vintervila</p> <p>Behandlingsintervall: Minst 5 dygn</p> <p>Behandlingsmetod: Sprutning</p> <p><b>Sallat i växthus – mot svampangrepp</b></p> <p>Maxdos: 8 l/ha</p> <p>Max antal behandlingar: 6 per kultur</p> <p>Behandlingstidpunkt: BBCH 13-49</p> <p>Behandlingsintervall: Minst 5 dygn</p> <p>Behandlingsmetod: Sprutning</p> <p><b>Björnbär, hallon och vinbär – mot svampangrepp</b></p> <p>Maxdos: 8 l/ha</p> <p>Max antal behandlingar: 6 per år</p> <p>Behandlingstidpunkt: BBCH 51-85</p> <p>Behandlingsintervall: Minst 5 dygn</p> <p>Behandlingsmetod: Sprutning</p> <p><b>Gurkväxter med ätliga skal – mot svampangrepp</b></p> <p>Maxdos: 8 l/ha</p> <p>Max antal behandlingar: 6 per kultur</p> <p>Behandlingstidpunkt: BBCH 12-89</p> <p>Behandlingsintervall: Minst 5 dygn</p> <p>Behandlingsmetod: Sprutning</p> <p><b>Lök på friland – mot svampangrepp</b></p> <p>Maxdos: 8 l/ha</p> <p>Max antal behandlingar: 6 per år</p> <p>Behandlingstidpunkt: BBCH 16-47</p> <p>Behandlingsintervall: Minst 7 dygn</p> <p>Behandlingsmetod: Sprutning</p> <p><b>Plantskolor och skogsplantskolor – mot svampangrepp</b></p> <p>Maxdos: 8 l/ha</p> <p>Max antal behandlingar: 6 per år</p> <p>Behandlingstidpunkt: BBCH 12-89</p> <p>Behandlingsintervall: Minst 5 dygn</p> <p>Behandlingsmetod: Sprutning</p>	Bayer A/S



Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
Teldor WG 50	Vin	<b>Preparatet får användas för bekämpning av gråmögel i vinodlingar på friland</b> Dos: 0,1%-ig lösning, högst 1500 l/ha. 1 behandling vid begynnande mognad. Karenstid: 21 dagar.	Föreningen Svenska Vinodlare
Teldor WG 50	Skogsplantskolor	<b>Preparatet får användas för bekämpning av gråmögel i skogsplantskolor</b> Högsta tillåtna dos är 750 g aktiv substans per ha (1,5 kg medel per ha). Medlet får appliceras högst tre gånger per säsong.	Föreningen Sveriges Skogsplantoproducenter
Teldor WG 50	Äpple och päron	<b>Äpple och päron – mot bägarröta (Botrytis) och fruktmögel (Monilia)</b> 1. Dos: 1,5 kg/ha 2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 10 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 60-69 (under blom) 5. Behandlingsutrustning: Fläktspruta	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
Tramat SC 500	Rödbetor	<b>Mot ogräs i odlingar av rödbetor på friland</b> Dosering: 1 x 0,45 l/ha eller 2 x 0,25 l/ha eller 3 x 0,14 l/ha Max antal behandlingar: 3 per år Behandlingsintervall: Minst 7 dygn Behandlingstidpunkt: BBCH 10-18 Vattenmängd: 150-200 l/ha Behandlingsutrustning: Bomspruta Får ej användas i odlingar av baby-leaf.	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag