



PREVICUR[®]
ENERGY

UPMA för Previcur Energy i frilandsgurka, spenat och prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland och i växthus

Frilandsgurka – mot gurkbladmögel

- Dos: 2,5 l/ha
- Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
- Behandlingsintervall: 7 dygn
- Behandlingstidpunkt: BBCH 12-80 (från 2 örtblad fram till innan första frukten är fullt mogen)
- Karenstid: 3 dagar
- Behandlingsmetod: Sprutning
- Rekommenderad vattenmängd: 600 l/ha

Spenat – mot spenatbladmögel

- Dos: 2,5 l/ha
- Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
- Behandlingsintervall: 7-10 dygn
- Behandlingstidpunkt: BBCH 14-48 (från 4 örtblad fram till 80 % av förväntad bladmassa uppnåtts)
- Karenstid: 14 dagar
- Behandlingsmetod: Sprutning
- Rekommenderad vattenmängd: 250-1000 l/ha

Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland, Max planthöjd 50 cm – mot bladmögelsvampar

- Dos: 2,5 l/ha
- Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
- Behandlingsintervall: 5-10 dygn
- Behandlingsmetod: Sprutning
- Rekommenderad vattenmängd: 200-600 l/ha
- Om produkten används på frukt bärande träd, buskar eller plantor ska frukt/bär avlägsnas före försäljning.

Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland – mot förökningssvampar (*Pythium spp.*, *Phytophthora spp.*)

- Dos: 3 l/ha (0,30 ml/m²)
- Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
- Behandlingsintervall: 10-14 dygn
- Behandlingsmetod: Utvattning på fuktigt substrat
- Rekommenderad vattenmängd: 200-2000 l/ha. Eftervattna med 25-30 mm vatten så att preparatet når rötterna.
- Vid **container-odling** beräkna 2-4 liter vatten/ m². Eftervattna med rent vatten.

Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter i växthus – mot bladmögelsvampar

- Dos: 0,25 ml/m²
- Antal behandlingar: Max 2 behandlingar per kultur
- Behandlingsintervall: 5-10 dygn
- Behandlingsmetod: Sprutning
- Rekommenderad vattenmängd: 20-60 ml vatten/m²
- Om produkten används på frukt bärande träd, buskar eller plantor ska frukt/bär avlägsnas före försäljning.

Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter i växthus – mot förökningssvampar (*Pythium spp.*, *Phytophthora spp.*)

- Dos: 3 ml/m² (30 l/ha)
- Antal behandlingar: Max 2 behandlingar
- Behandlingsintervall: 10-14 dygn
- Behandlingsmetod: Utvattning på fuktigt substrat
- Rekommenderad vattenmängd: 2-4 liter vatten/m². Eftervattna med rent vatten.
- Av hälsoskäl (för sprutförare) ska behandlad växthusyta vara mindre än 9500 m² per dag.

Övriga villkor:

- Vid hantering av produkten eller sprutvätskan samt vid spridning ska skyddshandskar och skyddskläder användas.
- Vid arbete med behandlade växt delar ska skyddshandskar användas.
- Återinträde i lokaler där sprutning utförts får inte ske tidigare än 24 timmar efter behandlingen. Efter 24 timmar ska skyddsutrustning i form av skyddskläder och skyddshandskar användas vid inträdet. 48 timmar efter behandlingen får återinträde ske utan skyddsutrustning.
- Växthus ska vara täckta permanenta odlingsutrymmen med ståhöjd. Odlingsutrymme behöver ej uppfylla definitionen av växthus enligt EU-förordning 1107/2009. Omfattar ej tunnelodling.