



**sencor**<sup>®</sup>  
Liquid

# Ogräsmedel nr. 1 i potatis

Flytande formulering

- **Optimerad formuleringsteknik** - flytande SC-formulering istället för granulat
- **Likvärdig eller något bättre effekt** mot ogräs än Sencor WG

## REKOMMENDATION POTATIS

Engångsbehandling strax före (DC 00) eller vid begynnande uppkomst (DC 10-20)

DOSERING	TIDPUNKT
0,35 l/ha	Efter sättnig låt fältet ligga orört tills de första groddarna "står i brynet". Om fältet bearbetas mekaniskt behandla någon dag efter den sista kupningen.

Delad behandling

DOSERING	TIDPUNKT
0,35 l/ha	På fält med högt ogrästryck och på mulljordar kan delad behandling vara aktuell. Behandla första gången strax före uppkomst.
0,23 l/ha	Vid behov upprepas behandlingen 7-14 dagar senare vid ca 5 cm blasthöjd (utan oljetillsats).

## OPTIMAL ANVÄNDNING

- Vid sprutning före grödans uppkomst rekommenderas behandling på fuktiga ogräsplantor.
- Vid behandling efter uppkomst ska potatisplantorna vara torra och temperaturen ej över 20°C.
- God markfukt säkrar en optimal effekt. Vid torra förhållanden behandla när fuktigheten är som bäst t ex tidigt på morgonen.
- Anpassa dosen med hänsyn till jordart, känslighet etc.
- Använda rätt sprutteknik så att en jämn fördelning utan överlappning eller överdos erhålles.
- Plöj alltid fälten/alternativ djupbearbeta efter upptagningen.
- Rengör sprutan noga efter användningen.

Gröda	Skadegörare	Tillåten behandling					Maxdos, totalt/ha	Karenstid, antal dagar
		Tidpunkt utvecklingsstadium	Maxdos /behandl.	Max antal behandl.	Intervall behandl.	Vätskemängd l/ha		
Potatis	Mot ogräs	DC 00-20	0,35 l/ha	2	7-14	150-200	0,58 l/ha	42
Morötter	Mot ogräs	DC 00 eller DC 11-12	0,175 l/ha	1	-	150-200	0,175 l/ha	60

## EFFEKTSHEMA SENCOR SC

Se rekommendationer, effekten för 0,58 l/ha nedan gäller vid delad behandling

Örtogräs	0,35 l/ha	0,58 l/ha
Baldersbrå	xxx	xxx
Blåklint	xxx	xxx
Dån-arter	xxx	xxx
Etternässla	xxx	xxx
Förgätmigej	xxx	xxx
Gullkrage	x	xx
Harkål	xxx	xxx
Jordrök	xxx	xxx
Kamomill	xxx	xxx
Korsört	xx	xxx
Lomme	xxx	xxx
Målla	xxx	xxx
Nattskatta	x	x
Penningört	xxx	xxx
Pilört	xx	xxx
Plister	xxx	xxx
Raps	xxx	xxx
Snärjmåra	x	x
Trampört	xx	xxx
Veronika	xxx	xxx
Viol	xxx	xxx
Våtarv	xxx	xxx
Åkerbinda	x	xx
Åkersenap	xxx	xxx
Åkerspergel	xxx	xxx
Åkertistel	-	x
<b>Gräsogräs</b>		
Vitgröe	xx	xx(x)
Åkerven	xx	xx(x)

Mycket god effekt, >90%

God effekt, 70–90%

Måttlig effekt, 40–70%

Svag effekt, <40%

### FÖR FÖRSTÄRKT EFFEKT PÅ:

- stora ogräs samt åkerbinda m.m. blanda med Spotlight Plus
- nattskatta blanda med Boxer
- gräsogräs, tistel, m.m. strategi med Titus

För registrerade varumärke  
se sidan 111 i vår Produktkatalog 2016

Kontakta din rådgivare eller besök [www.cropscience.bayer.se](http://www.cropscience.bayer.se) om du vill veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. April 2016.

Kontakta

**Stefan Hansson**  
076-1459904

**Mats Andersson**  
070-5671677

**Lisa Rydenheim**  
076-8677125

**Marcus Pedersen**  
072-3698232

## FLYTANDE SC-FORMULERING

- Lätt att mäta upp och hantera
- Lätt att rengöra dunken – 3 liter

## BLANDBARHET

- Sencor SC 600 är blandbar med Titus, Spotlight Plus, Fenix, Reglone, Boxer, Centium och glyfosat.
- Blanda ej Sencor SC 600 med andra bekämpningsmedel eller superolja vid behandling efter uppkomst. (Blandning med Titus kan även ske efter potatisens uppkomst).

## SKYDDSZON

En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd 1 år före behandlingen. Skyddszonen ska bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter. Den markanpassade skyddszonen ska räknas från strandlinjen för högvattenytan eller strandbrinkens överkant och ska hållas gentemot de vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.

## SORTKÄNSLIGHET

Vissa potatissorter är känsliga för Sencor SC 600. Några sorter bör endast behandlas före uppkomst och det finns även sorter som inte ska behandlas alls med Sencor SC 600. Symptomen syns vanligen som en guldfärgning längs blad-nerverna och är av övergående karaktär. Behandla ej utsädesodlingar efter uppkomst. Ogräsbekämpning i färskpotatis kan föresena utvecklingen ett fåtal dagar. Vid osäkerhet för sortkänslighet kontakta utsädesleverantören eller Bayer.

## EFTERFÖLJANDE GRÖDA

Sådd av höstoljeväxter samma år liksom grönsaker påföljande år avrådes. Lätta muldfattiga fält, behandlade med Sencor SC 600 på våren, bör följande höst plöjas före eventuell sådd av höstsäd.

## Omvandlingstabell

Sencor WG 70	Sencor SC 600
0,2 kg	0,23 l
0,3 kg	0,35 l
0,4 kg	0,46 l
0,5 kg	0,58 l

Dos Sencor SC = 1,16 x Dos Sencor WG  
Observera dosbegränsningen – se tabell med Användningsvillkor

