

Utvidgat produktgodkännande innebär att preparat som är godkända i någon gröda i Sverige, efter beslut från Kemli, får användas i en annan gröda utan att detta anges på etiketten. Utvidgat produktgodkännande gäller så länge preparatet är godkänt, på samma registreringsnummer.

Klassificerings- och märkningsinformation gäller även för denna användning.

Användning enligt ovan sker på eget ansvar. Bayer ansvarar inte för eventuell bristande effekt eller skador på grödan.

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>Aliette</b>	Vin	Mot bladmögel i vinodlingar på friland. 1. Dos: 2,5 kg/ha 2. Antal behandlingar: Max 4 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 10 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-79 (från 3 utvecklade blad fram till innan bären börjar mogna och ändra färg) 5. Karenstid: 35 dygn 6. Behandlingsmetod: Sprutning 7. Rekommenderad vattenmängd: 200-1000 l/ha	Föreningen Svenska Vinodlare
<b>Betanal/ Kemifam Power</b>	Plantskoleväxter (inklusive skogsplantskoleväxter) på friland och i växthus	Mot ogräs i plantskolor och skogsplantskolor. <b>Friland:</b> 1. Maxdos: 0,6 l/ha 2. Högst 3 behandlingar per år 3. Behandlingsintervall: 7-14 dygn 4. Behandlingstidpunkt: tidigast 3 veckor efter sådd 5. Rekommenderad vattenmängd: 200-1200 l/ha <b>Växthus:</b> 1. Maxdos: 0,18 ml/m <sup>2</sup> 2. Högst 1 behandling per år 3. Behandlingstidpunkt: tidigast 3 veckor efter sådd 4. Rekommenderad vattenmängd: 200-1200 l/ha	Föreningen Sveriges Skogsplantproducenter
<b>Betanal Power/ Kemifam Power</b>	Rödbetor	Mot ogräs i odlingar av rödbetor på friland. Dos: max 0,6 liter/ha Högst 3 behandlingar per år.	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
<b>Biscaya OD 240 Reg. Nr. 4791</b>	Åkerböna	Preparatet får användas mot bönsmyg ( <i>Bruchus rufimanus</i> Boh.) i odlingar av åkerböna. 1. Maxdos: 0,3 l produkt/ha (motsvarar 0,072 kg ai/ha). 2. Högst 1 behandling per år. 3. Behandlingstidpunkt: Utvecklingsstadium (BBCH) 51-77. 4. För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom".	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
<b>Biscaya OD 240 Reg. Nr. 4791</b>	Röd-, alsike- och vitklöver	Preparatet får användas mot klöverspetsvivel i utsädesodlingar av röd-, alsike- och vitklöver. Dos: högst 0,3 l/ha. Högst en behandling per år. Härutöver gäller det villkor som framgår av produktens märkning. Den som använder växtskyddsmedlet för detta användningsområde ansvarar själv för eventuell fytotoxicitet eller bristande effektivitet hos medlet.	Frö- och Oljeväxtodlarna
<b>Calypso SC 480 Reg. Nr. 4820</b>	Hallon	Preparatet får användas mot skadeinsekter i frilandsodlingar av hallon. Dos: 0,25 l/ha. Högst två behandlingar per år. Karenstid: 3 dagar. En skyddszon på 10 meter till omgivningen måste tillämpas.	GRO, Gröna näringens riksorganisation

Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>Calypso SC 480</b> <b>Reg Nr. 4820</b>	<p>Blåbär, vinbär, krusbär, björnbär, morötter, frilandsgurka i tidigt skede samt prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland och tomat, gurka, aubergine, pepparfrukt (<i>Capsicum annum</i>) samt prydnadsväxter i växthus</p> <p>Preparatet får användas mot sugande och bitande skadeinsekter i yrkesmässiga odlingar av:  <b>Björnbär, blåbär, vinbär och krusbär</b>  1. Maxdos: 0,25 l/ha i 600-1000 l vatten/ha.  2. Högst 2 behandlingar/år.  3. Sprayintervall 21 dagar.  4. Behandlingstidpunkt: BBCH 57-59, 69-72.  5. Karens 14 dagar.  6. "Hjälpredan" skall användas.  <b>Morot</b>  1. Maxdos: 0,20 l/ha i 600-1000 l vatten/ha.  2. Högst 2 behandlingar/år.  3. Sprayintervall 7 dagar.  4. Behandlingstidpunkt: BBCH 14-48.  5. Karens 7 dagar.  6. "Hjälpredan" skall användas.  <b>Frilandsgurka</b>  1. Maxdos: 0,20 l/ha i 300-400 l vatten/ha.  2. Högst 2 behandlingar/år.  3. Sprayintervall 7-14 dagar.  4. Behandlingstidpunkt: BBCH 10-75.  5. Karens 3 dagar.  6. "Hjälpredan" skall användas.  <b>Prydnadsväxter på friland</b>  1. Maxdos: 0,25 l/ha i 500-1500 l vatten/ha.  2. Högst 2 behandlingar/kultur &amp; år.  3. Sprayintervall 10-14 dagar.  4. "Hjälpredan" skall användas.  <b>Växthus Tomater, gurka, pepparfrukter (<i>Capsicum annum</i> L.) och aubergine</b>  1. Maxdos: 0,25 l/ha i 1500 l vatten/ha (0,016 %).  2. Högst 2 behandlingar/kultur och år.  3. Sprayintervall 14 dagar.  4. Behandlingstidpunkt: BBCH 35-89.  5. Karens 3dagar.  6. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid sprutning i växthus.  <b>Växthus Prydnadsväxter</b>  1. Maxdos: 0,25l/ha i 1000-1500 l vatten/ha (0,016-0,025 %).  2. Högst 2 behandlingar/år (säsong).  3. Sprayintervall 10-14 dagar.  4. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid sprutning i växthus.</p>	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
<b>Calypso SC 480</b> <b>Reg Nr. 5427</b>	<p>Jordgubbar, hallon, björnbär, blåbär, och vinbär i tunnel och växthus</p> <p>Mot insektsangrepp i växthus- och tunnelodlingar av:  <b>Jordgubbar</b>  Maxdos: 0,025 ml/m<sup>2</sup>  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 54-75  Karensid: 3 dygn  Vattenmängd: 60-100 ml/m<sup>2</sup>  Behandlingsmetod: Sprutning  <b>Hallon och björnbär</b>  Maxdos: 0,025 ml/m<sup>2</sup>  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 54-75  Karensid: 6 dygn  Vattenmängd: 60-100 ml/m<sup>2</sup>  Behandlingsmetod: Sprutning  <b>Blåbär och vinbär</b>  Maxdos: 0,025 ml/m<sup>2</sup>  Max antal behandlingar: 2 per år  Behandlingsintervall: Minst 21 dygn  Behandlingstidpunkt: BBCH 57-59 samt 69-72  Karensid: 14 dygn  Vattenmängd: 60-100 ml/m<sup>2</sup>  Behandlingsmetod: Sprutning  För ytterligare villkor se: <a href="http://www.kemi.se">www.kemi.se</a></p>	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>Cerone</b>	Tomater	Preparatet får användas för synkroniserad mognad av tomater i växthus. 1. Maxdos: 0,1 ml/m <sup>2</sup> i 100 ml vatten/m <sup>2</sup> . 2. Högst 1 behandling per år. 3. Behandlingstidpunkt: 7-10 dagar före sista skörd. 4. Vid hantering av växtskyddsmedlet eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas. 5. Vi sprutning i växthus ska skyddshandskar och skyddskläder användas.	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
<b>Cerone</b>	Äpple, päron och prydnadsväxter	<b>För kartgallring av äpple och päron:</b> Maxdos: 0,4 l/ha Max antal behandlingar: 2 per år Behandlingsintervall: Minst 7 dygn Behandlingstidpunkt: BBCH 57-72 (ballongstadium till karten är max 20 mm i diameter) Vattenmängd: 200-500 l/ha Behandlingsutrustning: Fläktspruta <b>För mognadsreglering/färgförbättring av äpplen:</b> Maxdos: 0,4 l/ha Max antal behandlingar: 1 per år Behandlingstidpunkt: BBCH 78-85 Karenstid: 10 dygn Vattenmängd: 200-500 l/ha Behandlingsutrustning: Fläktspruta <b>För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus:</b> Maxdos: 225 µl/m <sup>2</sup> Max antal behandlingar: 1 per år (per kalenderår och per kvadratmeter golvyta) Behandlingstidpunkt: Från BBCH 14 (När växten har minst 4 blad och är 10 cm hög) Produkten ska spädas med vatten till en koncentration som inte får överstiga 0,15 %. Behandlingsmetod: Sprutning eller utvattning För ytterligare villkor se: <a href="http://www.kemi.se">www.kemi.se</a>	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag
<b>Confidor WG 70</b>	Sallat och sallatskål i växthus	Preparatet får användas för bekämpning av bladlöss vid plantupptragning i växthus av sallat och sallatskål. Dos för 1000 plantor: 3,4 g Confidor WG till 20 l/vatten. 1 behandling per kultur får utföras. Behandling får ej ske senare än 42 dagar före skörd.	GRO, Gröna näringens riksorganisation
<b>Gratil 75 WG</b>	Röd-, alsike- och vitklöver	Preparatet får användas för bekämpning av örtartade ogräs (ex. baldersbrå, pilört, målla och viol) i utsädesodlingar av röd-, alsike- och vitklöver. 1. Maxdos: 15 g/ha 2. Högst 1 behandling per år. 3. Behandlingstidpunkt: tidigast när klöver har nått spadbalsstadium (BBCH 11)	Frö- och Oljeväxtodlarna ek.för
<b>Folicur Xpert</b>	Utsädesodlingar av ängsgröe, engelsk rajgräs, vitklöver, rödklöver, alsikeklöver och lusern frö	<b>Ängsgröe och engelsk rajgräs till utsäde – mot svampangrepp</b> Maxdos: 0,5 l/ha Max antal behandlingar: 2 per odlingsår Behandlingsintervall: Minst 18 dygn Behandlingstidpunkt: Höst BBCH 14-30 , Vår BBCH 30-69 Vattenmängd: 100-300 l/ha Behandlingsutrustning: Bomspruta Övriga villkor: Högst en behandling på hösten och högst en behandling på våren. Behandlad gröda får inte användas till foder. <b>Röd-, vit- och alsikeklöver samt lucern till utsäde – mot svampangrepp</b> Maxdos: 0,5 l/ha Max antal behandlingar: 2 per kalenderår Behandlingsintervall: Minst 18 dygn Behandlingstidpunkt: BBCH 40-69 Vattenmängd: 100-300 l/ha Behandlingsutrustning: Bomspruta Övriga villkor: Totala maximala dosen per kalenderår får inte överskrida 1,0 liter produkt/ha. Behandlad gröda får inte användas till foder.	Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för.
<b>Gratil 75 WG</b>	Nordmansgran	Preparatet får användas mot örtogräs i odlingar av nordmansgran. Dos: högst 20 g/ha.	Björnstorp & Svenstorps Godsförvaltning
<b>Hussar Plus OD</b>	Ängsgröe och rödsvingel	Mot ogräs i utsädesodlingar av ängsgröe och rödsvingel: 1. Dos: 200 ml/ha 2. Antal behandlingar: Max 1 behandling 3. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-30, endast vårbehandling 4. Behandlingsutrustning: Bomspruta Eller: 1. Dos: 100 ml/ha 2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 7-14 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 13-30, endast vårbehandling 5. Behandlingsutrustning: Bomspruta	Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare ek. för.

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>Infito</b>	Sallat, kål, spenat och kepalök på friland Äpple, päron, plommon och körsbär	<p><b>Sallat på friland – mot sallatsbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 1,6 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 10 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 30-49 (från plantan har uppnått 30% av förväntad bladmassa fram till huvudet har uppnått full storlek och typisk form/bladmassan fullbildad)</li> <li>Karenstid: 7 dagar</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha</li> </ol> <p><b>Spenat på friland – mot spenatbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 1,6 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 10 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 30-49 (från plantan har uppnått 30% av förväntad bladmassa fram till bladmassan är fullbildad)</li> <li>Karenstid: 14 dagar</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha</li> </ol> <p><b>Kål på friland (röd-, vit-, spets- och savojkål, blomkål, broccoli, brysselkål, grönkål och kålrabbi) – mot bladmögel och vitrost</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 1,6 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 3 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 14 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 40-49 (från huvudet börjar bildas fram till huvudet har uppnått full storlek och typisk form/bladmassan fullbildad)</li> <li>Karenstid: 14 dagar</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-800 l/ha</li> </ol> <p><b>Kepalök på friland – mot lökbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 1,6 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 3 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 41-47 (från bladbasen tjocknar och förlängs fram till löken har uppnått full storlek)</li> <li>Karenstid: 7 dagar</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 300-600 l/ha</li> </ol> <p>Lökbladen får inte användas som föda eller foder</p>	Bayer A/S
<b>Maister</b>	Äpple, päron, plommon och körsbär	<p><b>Mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 150g/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandling</li> <li>Behandlingsintervall: Minst 10 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH &lt;59</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> <li>Totala maximala dosen får inte överskrida 150 g produkt/ha och odlingssäsong</li> </ol> <p>Etableringsåret kan produkten användas fram till knoppsprickning utan avskärningsutrustning. Skördeår ska produkten användas med en avskärningsutrustning, så att inte sprutvätskan hamnar på trädet, före knoppsprickning</p>	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>Movento SC 100</b>	Jordgubbar, dill, persilja, kepalök, gräslök och stjälkselleri på friland, prydnadsväxter i växthus	<p><b>Jordgubbar på friland - mot insekter och kvalster</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 1,0 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 14 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 13-56 eller 91-97 (före blom eller efter skörd)</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 300-500 l/ha</li> </ol> <p><b>Jordgubbar i tunnel och växthus - mot insekter och kvalster</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 10 ml/100 m<sup>2</sup></li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 14 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 13-56 eller 91-93 (före blom eller efter skörd)</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: Tunnel 40-200 ml/m<sup>2</sup>, Växthus 3-5 l/100 m<sup>2</sup></li> </ol> <p><b>Dill o persilja på friland – mot insekter</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,45 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 14 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 41-49 (från nästintill färdigutvecklad planta fram till skördeklar planta)</li> <li>Karenstid: 7 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> </ol> <p><b>Kepalök på friland – mot insekter</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,75 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 13-47 (från 3 synliga blad fram till att 70% av lökstorleken är nådd)</li> <li>Karenstid: 7 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> </ol> <p><b>Gräslök på friland – mot insekter</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,45 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 13-47 (från 3 synliga blad fram till att 70% av lökstorleken är nådd)</li> <li>Karenstid: 7 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Får inte användas under blomning</li> </ol> <p><b>Stjälkselleri på friland – mot insekter</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,45 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 14 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 41-49 (från nästintill färdigutvecklad planta fram till skördeklar planta)</li> <li>Karenstid: 7 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> </ol> <p><b>Prydnadsväxter i växthus – mot insekter och kvalster</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 7,5 µl/m<sup>2</sup></li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 14 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: Före blomning</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> </ol>	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

**Movento**

Morot, rotselleri, rotpersilja, palsternacka, kålrot, rova och rödbeta på friland. Sallatsväxter och bladgrönsaker (även baby-leaf) i tunnel

**Morot, rotselleri, rotpersilja, palsternacka, kålrot, rova och rödbeta på friland – mot insekter**

Maxdos: 0,75 l/ha  
Max antal behandlingar: 3 per år  
Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  
Behandlingstidpunkt: BBCH 12-49  
Karenstid: 21 dygn  
Vattenmängd: 200-500 l/ha  
Behandlingsmetod: Sprutning

**Sallatsväxter och bladgrönsaker (även baby-leaf) i tunnel – mot insekter**

Maxdos: 7,5 ml/100 m<sup>2</sup>  
Max antal behandlingar: 2 per år  
Behandlingsintervall: Minst 14 dygn  
Behandlingstidpunkt: BBCH 12-49  
Karenstid: 7 dygn  
Vattenmängd: 2-5 l/100 m<sup>2</sup>  
Behandlingsmetod: Sprutning  
För ytterligare villkor se: [www.kemi.se](http://www.kemi.se)

Lantbrukarnas  
Ekonomi-Aktiebolag



Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>Previcur Energy</b>	Gurka och spenat på friland, prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland och i växthus	<p><b>Frilandsgurka – mot gurkbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 2,5 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 12-80 (från 2 örtblad fram till innan första frukten är fullt mogen)</li> <li>Karenstid: 3 dagar</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 600 l/ha</li> </ol> <p><b>Spenat – mot spenatbladmögel</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 2,5 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 7-10 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 14-48 (från 4 örtblad fram till 80 % av förväntad bladmassa uppnåtts)</li> <li>Karenstid: 14 dagar</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 250-1000 l/ha</li> </ol> <p><b>Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland, Max planthöjd 50 cm – mot bladmögelssvampar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 2,5 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 5-10 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-600 l/ha</li> </ol> <p>Om produkten används på frukt bärande träd, buskar eller plantor ska frukt/bär avlägsnas före försäljning.</p> <p><b>Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland – mot förökningssvampar (<i>Pythium spp.</i>, <i>Phytophthora spp.</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 3 l/ha (0,30 ml/m<sup>2</sup>)</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 10-14 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Utvattning på fuktigt substrat</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 200-2000 l/ha. Eftervattna med 25-30 mm vatten så att preparatet når rötterna.</li> </ol> <p>Vid container-odling beräkna 2-4 liter vatten/ m<sup>2</sup>. Eftervattna med rent vatten.</p> <p><b>Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter i växthus – mot bladmögelssvampar</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,25 ml/m<sup>2</sup></li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar per kultur</li> <li>Behandlingsintervall: 5-10 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Sprutning</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 20-60 ml vatten/m<sup>2</sup></li> </ol> <p>Om produkten används på frukt bärande träd, buskar eller plantor ska frukt/bär avlägsnas före försäljning.</p> <p><b>Prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter i växthus – mot förökningssvampar (<i>Pythium spp.</i>, <i>Phytophthora spp.</i>)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 3 ml/m<sup>2</sup> (30 l/ha)</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: 10-14 dygn</li> <li>Behandlingsmetod: Utvattning på fuktigt substrat</li> <li>Rekommenderad vattenmängd: 2-4 liter vatten/m<sup>2</sup>. Eftervattna med rent vatten.</li> </ol> <p>Av hälsoskäl (för sprutförare) ska behandlad växthusyta vara mindre än 9500 m<sup>2</sup> per dag.</p>	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
<b>Sencor SC 600</b>	Morötter och sparris på friland	<p>Mot ogräs vid odling av morötter och sparris på friland:</p> <p><b>Morötter alternativ 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,1 l/ha + 0,075 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: Minst 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 00 (före uppkomst) eller BBCH 12-16 (när morötterna har 2-6 flikiga blad)</li> <li>Karenstid: 60 dygn</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> </ol> <p><b>Morötter alternativ 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,075 l/ha + 0,075 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 2 behandlingar</li> <li>Behandlingsintervall: Minst 7 dygn</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 12-16 (när morötterna har 2-6 flikiga blad)</li> <li>Karenstid: 60 dygn</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> </ol> <p><b>Sparris:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dos: 0,3 l/ha</li> <li>Antal behandlingar: Max 1 behandling</li> <li>Behandlingstidpunkt: BBCH 14-19</li> <li>Karenstid: 7 dygn</li> <li>Behandlingsutrustning: Bomspruta</li> </ol>	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund

Produkt	Gröda	Användningsvillkor	Sökande
<b>Sencor SC 600</b>	Plantskoleväxter	Mot ogräs i frilandsodling av plantskoleväxter före vegetering: Maxdos: 0,35 l/ha Max antal behandlingar: 1 per år Behandlingstidpunkt: April - juli Vattenmängd: 200-400 l/ha Behandlingsutrustning: Bomspruta Behandling får inte göras då ogrästäckets högre än 10 cm.	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag
<b>Teldor WG 50</b>	Vin	Preparatet får användas för bekämpning av gråmögel i vinodlingar på friland. Dos: 0,1%-ig lösning, högst 1500 l/ha. 1 behandling vid begynnande mognad. Karenstid: 21 dagar.	Föreningen Svenska Vinodlare
<b>Teldor WG 50</b>	Skogsplantskolor	Preparatet får användas för bekämpning av gråmögel i skogsplantskolor. Högsta tillåtna dos är 750 g aktiv substans per ha (1,5 kg medel per ha). Medlet får appliceras högst tre gånger per säsong.	Föreningen Sveriges Skogsplantproducenter
<b>Teldor WG 50</b>	Äpple och päron	<b>Äpple och päron – mot bägarrota (Botrytis) och fruktmögel (Monilia)</b> 1. Dos: 1,5 kg/ha 2. Antal behandlingar: Max 2 behandlingar 3. Behandlingsintervall: 10 dygn 4. Behandlingstidpunkt: BBCH 60-69 (under blom) 5. Behandlingsutrustning: Fläktspruta	LRF, Lantbrukarnas Riksförbund
<b>Tramat SC 500</b>	Rödbetor	Mot ogräs i odlingar av rödbetor på friland: Dosering: 1 x 0,45 l/ha eller 2 x 0,25 l/ha eller 3 x 0,14 l/ha Max antal behandlingar: 3 per år Behandlingsintervall: Minst 7 dygn Behandlingstidpunkt: BBCH 10-18 Vattenmängd: 150-200 l/ha Behandlingsutrustning: Bomspruta Får ej användas i odlingar av baby-leaf.	Lantbrukarnas Ekonomi-Aktiebolag