



# MaisTer®

# MaisTer ger flera fördelar!

- Bekämpar både gräsogräs och örtogräs i majs
- Mycket bred gräsograseffekt, även på kvickrot och alla hirsarter
- Bekämpar även besvärliga rotoogräs
- Ogräsens tillväxt stoppas snabbt
- Inga problem med efterföljande konventionell lantbruksgröda
- Skonsam mot majsen

## Två behandlingar för rena majsält

Mellan till högt ogrässtryck.  
Bred flora av gräsogräs och örtogräs

Högt ogrässtryck.  
Bred flora av gräsogräs och örtogräs, inklusive näva

**1.** Första behandlingen görs när ogräset är i hjärtbladsstadiet upp till två örtblad. Anpassa dosen efter ogräsfloran och tillsätt Starane om du har åkerbinda. Har du veronika eller tistel byt ut Starane mot Callisto.

50–75 g MaisTer  
+ 0,5 l Callisto + MaisOil

50–75 g MaisTer + 11,25 g Harmony  
+ 0,3 l Callisto + MaisOil

**2.** Andra behandlingen görs cirka 10–14 dagar efter första behandlingen. Även här tillsätts blandningspartner efter behov.

50–100 g MaisTer  
+ 0,3 l Starane + MaisOil

50–100 g MaisTer  
+ 0,5 l Callisto + MaisOil



### Verkningsätt

- Bladverkande medel
- Fullt systemisk, den aktiva substansen transporteras inuti ogräsplantan
- Stoppar ogräsets tillväxt inom 1–3 dagar
- Ogräset dör inom 7–20 dagar

### Temperatur och väderlek

Behandla när det är tillväxt i ogräs och gröda, samt temperaturen över 8 °C.

Behandling bör inte ske när risk för nattfrost föreligger. Vid behandling i perioder med mycket varmt väder (vid temperaturer över 25 °C), kan behandling ge en övergående guldfärgning/minskad tillväxt av grödan. Denna tillväxtbegränsning är övergående och normalt utan betydelse för skörden.

### Jordart och markfukt

Upptaget sker övervägande via bladen, därför har markfukten vid behandlingstillfället och jordarten mindre betydelse.

### Regnfasthet

MaisTer är regnfast två timmar efter behandling.

### MaisOil

MaisOil skall alltid användas tillsammans med MaisTer. Andra typer av oljor rekommenderas ej. Följande doseringar gäller:

Vid denna dos MaisTer	använd denna mängd MaisOil
50 g MaisTer	0,67 l MaisOil
75 g MaisTer	1,00 l MaisOil
100 g MaisTer	1,33 l MaisOil
125 g MaisTer	1,67 l MaisOil
150 g MaisTer	2,00 l MaisOil

1 förpackning innehåller:  
750 g MaisTer och 2 x 5 l MaisOil

### Blandbarhet

MaisTer kan blandas med Harmony 50 SX, Starane 180, Callisto, Basagran SG, Matrigon 72 SG och Sumi-Alpha 5 FW.

### Majssorter





MaisTer är skonsam i de flesta majssorter, men enstaka sorter kan vara känsliga och bör därför inte behandlas. Aktuell lista över sorter uppdateras på vår hemsida: [www.bayercropscience.se/produkter/maister](http://www.bayercropscience.se/produkter/maister).

# Maister dosschema

Den dos som anges i dosschemat avser den dos som behövs för att bekämpa respektive ogräs.

Maximalt 150 g/ha och år får användas. Max två behandlingar per gröda.

Örtogräs	50 g	75 g	100 g	125 g	150 g	2 x 75 g Maister + 0,3 l Starane	2 x 75 g Maister + 0,5 l Callisto
Baldersbrå							
Dån							
Förgätmigej							
Gullkrage							
Jordrök							
Lomme							
Målla							
Nattskatta							
Näva - flik*							
Näva - mjuk*							
Näva - skat*							
Penningört							
Pilört, vanlig							
Plister							
Raps							
Snärjmåra							
Trampört							
Veronika							
Viol							
Våtarv							
Åkerbinda							
Åkerkål							
Åkerpilört							
Åkersenap							
Gräsogräs	50 g	75 g	100 g	125 g	150 g		
Flyghavre							
Hönshirs**							
Kavelhirs**							
Kvickrot***							
Rajgräs							
Vitgröe							
Rotogräs	50 g	75 g	100 g	125 g	150 g		
Knölsyska							
Kålmolke							
Tussilago							
Åkerfräken							
Åkermolke							
Åkermynta							
Åkertistel							
Vattenpilört							

	Mycket god effekt, mer än 90 %
	God effekt, 70–90 %
	Måttlig effekt, 40–70 % höj dosen eller tillsätt blandningspartner
	Svag effekt, mindre än 40 % tillsätt passande blandningspartner

\* Nävaplantor i hjärtbladsstadiet / små plantor - storleken på ogräsplantorna viktigare än dosen

\*\* Hirsbekämpning, dos; 75–100 g Maister i andra behandlingen

\*\*\* Kvickrotsbekämpning, dos; 100–150 g Maister i första behandlingen, när kvickroten har 3–4 blad

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter:  
 Mats Andersson 070-567 16 77, Stefan Hansson 076-145 99 04  
 Lisa Rydenheim 076-867 71 25, Torsten Gillberg 070-584 74 13



150 Years  
 Science For A Better Life

[www.bayercropscience.se](http://www.bayercropscience.se)

Kontakta din rådgivare eller besök [www.bayercropscience.se/produkter/maister](http://www.bayercropscience.se/produkter/maister) om du vill veta mer. Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. April 2013

Angivna produktnamn är registrerade varumärken:

Callisto®: Syngenta, Harmony® 50 SX, Sumi-Alpha® 5 FW: DuPont, Starane® 180, Matrigon® 72 SG: Dow AgroSciences, Basagran® SG: BASF